

# お薬情報提供文書（オンライン診療）

様

処方日：令和 年 月 日

緊急避妊用女性ホルモン剤

ノルレボ錠1.5mg

レボノルゲストレル錠1.5mg「F」

医療機関名：

医師氏名：

服用月日：令和 年 月 日

電話番号：

服用時間： AM・PM 時 分

## この薬の効果

- 主に女性のホルモン分泌系に作用して排卵を抑え、妊娠を防ぎます。また、子宮に作用し、受精卵の着床を防いだり、子宮内に精子を入りにくくしたりする働きもあります。
- この薬を飲むことによって、完全に妊娠が回避できるものではありません。

## 服用前の注意

- 次に該当する方は、この薬を服用することができません。（重篤な肝障害のある方、妊婦）

## 服用後の注意

- 一時的ですが気持ちが悪くなったり、吐いたりする場合があります。この薬を服用後2時間以内に吐いてしまった場合は、追加服用の必要があるかもしれないので、すぐに処方してもらった医師に相談してください。
- 頭痛、めまい、腹痛、倦怠感、眠くなるなどの症状があらわれることがあります。
- 月経のような出血や不正子宮出血があらわれることがあります。
- 月経周期や出血の状況（日数や量）に一時的な変化が見られることがあります。
- セイヨウオトギリソウ（セントジョーンズ・ワート）含有のサプリメントやハーブの摂取はしないように気をつけてください。
- この薬を服用しても、性感染症の予防にはなりません。
- この薬の服用後も、無防備な性交が行われた場合、妊娠する可能性がありますので、妊娠を避けたいというのであれば、適切な避妊を行ってください。自分に合った避妊法については、医師または薬剤師に相談してください。
- 約3週間後に必ず産婦人科に受診して医師の診察を受けてください。

（授乳中の方のみ）

- この薬の成分は乳汁中に移行しますので、授乳中の方は、服用後少なくとも24時間は授乳しないでください。

「緊急避妊の対面診療が可能な  
産婦人科医療機関等の一覧」

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186912\\_00002.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186912_00002.html)

（厚生労働省ホームページ）



令和 年 月 日

薬局名：

薬剤師氏名：

所在地：

電話番号：

（手順⑦本人交付用 兵庫県薬剤師会版）